ROfert® AMINO

Producțiile confirmă calitatea!

EPIN®

Compoziție chimică (m/v | m/m):

Macronutrienți	**% m/v**	**% m/m**
Azot total (N)	2,66	2,40
Azot organic (N org.)	2,66	2,40
Carbon organic (C org.)	13,34	12,02
Substanță uscată	**34,08**	**30,70**
Microelemente	**% m/v**	**% m/m**
Bor (B)* sub formă de acid	0,22	0,20
Cupru (Cu)* sub formă de sulfat	0,22	0,20
Fier (Fe)* sub formă de sulfat	1,44	1,30
Mangan (Mn)* sub formă de sulfat	0,56	0,50
Molibden (Mo)* sub formă de sare de sodiu	0,02	0,02
Zinc (Zn)* sub formă de sulfat	0,56	0,50
* Complet solubile în apă		
Îngrășământul conține suplimentar materie organică – 70% din substanța uscată.		

ROfert®AMINO este un îngrășământ lichid, de origine vegetală, cu un conținut de peste 70% Materie Organică, Aminoacizi și microelemente, perfect pentru reducerea deficitului de micronutrienți. **ROfert®AMINO** influențează pozitiv creșterea plantelor, ajută la dezvoltarea rapidă a sistemului radicular, a aparatului foliar și crește rezistența plantelor la factorii de stres biotic și abiotic, prevenind dezvoltarea diferitelor boli datorită răspunsului imun ridicat al culturii.

BENEFICIILE PRODUSULUI ROFERT®AMINO:

- Aminoacizii special selectați și concentrați îmbunătățesc rezistența plantelor la boli și condiții de stres;
- În cazul utilizării după stres, produsul susține procesele de regenerare și minimizează pierderile de recolte;
- Plante sănătoase, puternice și bine dezvoltate;
- Efect sporit al utilizării pesticidelor;
- Randament și calitate crescută a culturii;

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Îngrășământul se păstrează și se transportă în ambalajele originale, bine închise, la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C, evitând variațiile bruște de temperatură. A nu se depozita îngrășămintele în straturi.

CE **CFP 1(B)(II)**
Îngrășământ organo-mineral lichid N, în soluție, cu microelemente, 2,4 / 2,4

FRAZE DE PERICOL

Provoacă leziuni oculare grave. Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului. Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

FRAZE DE PRECAUȚIE

Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. Spălați-vă bine mâinile și fața după utilizare. Evitați dispersarea în mediu. Purtați echipament de protecție a ochilor în timpul preparării soluției de lucru și al aplicării. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. În caz de expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul. Eliminați conținutul/recipientul ca deșeu periculos.
Conține: sulfat de cupru pentahidrat (nr. CAS 7758-99-8), sulfat de mangan monohidrat (nr. CAS 10034-96-5), acid boric (nr. CAS 10043-35-3), sulfat de zinc monohidrat (nr. CAS 7446-19-7).

COMPONENTE

Componente: hidrolizat de proteine vegetale[1], sulfat de fier heptahidrat[2] (nr. CAS 7782-63-0).
[1] produse secundare ale industriei alimentare
[2] materii prime și amestecuri virgine.
Conținut redus de cloruri.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Nerespectarea recomandărilor privind depozitarea, amestecarea, diluarea și utilizarea produsului conform instrucțiunilor de pe etichetă poate afecta eficacitatea acestuia. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru consecințele, pierderile sau prejudiciile rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
Conține: hidrolizat de proteine vegetale, inclusiv aminoacizi selectați: acid aspartic, acid glutamic, serină, histidină, glicină, treonină, arginină, alanină, tirozină, valină, metilalanină, fenilalanină, izoleucină, leucină, lizină, cisteină, prolină, triptofan.
Exclusiv pentru utilizatori profesionali.
Data fabricației și termenul de valabilitate / Nr. lotului: a se vedea pe ambalaj.

Cultură	Doză produsului l/ha	Numărul tratamentelor și perioadele de aplicare
Culturi de câmp	1 - 3	2–3 tratamente, de la faza de înfrățire / în perioada de creștere intensivă
Livezi și arbuști fructiferi	1 - 3	2–3 tratamente, de la faza de buton roz / în perioada de creștere intensivă a fructelor nou formate și a fructelor
Culturi legumicole	1 - 3	2–3 tratamente, începând cu faza de creștere intensivă
Fertirigare	0,2 - 0,3%	În funcție de necesarul culturii
A se utiliza numai în caz de necesitate justificată. A nu se depăși doza recomandată.		

PREPARAREA SOLUȚIEI DE LUCRU

1) Umpleți rezervorul pulverizatorului până la jumătate cu apă,
2) porniți sistemul de agitare,
3) adăugați cantitatea recomandată de îngrășământ, după omogenizarea prealabilă a produsului,
4) adăugați produsul de protecție a plantelor, dacă este cazul,*
5) completați rezervorul cu apă până la volumul final, menținând sistemul de agitare în funcțiune,
6) după efectuarea tratamentului, spălați pulverizatorul cu apă.
Soluția de lucru trebuie utilizată imediat după preparare.
A se omogeniza bine înainte de utilizare.
* Înainte de utilizarea în amestec cu produse de protecție a plantelor sau cu alte îngrășăminte, se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate (test în borcan).

TEHNICA DE APLICARE

Aplicare foliară – cu toate tipurile de pulverizatoare. Volumul de apă recomandat: culturi de câmp: 200–400 L/ha; livezi și arbuști fructiferi: 500–700 L/ha; culturi legumicole: 400–600 L/ha.
Fertirigare – produsul poate fi utilizat în sistemele de irigare, inclusiv prin picurare. A nu se depăși concentrația de 0,3%.





PERICOL
UFI: RVJ4-H15M-87AM-E2V9

Produs pentru:
ROFERT ROMANIA S.R.L.
Str. Calea București, Nr.40,
Sat Pălținișu, Jud. Ialomița
Tel: 0729.036.395
E-mail: contact@rofert.ro
Producător VitaFer Sp. z o.o. sp.k.
ROfert este Marcă înregistrată
OSIM din 06/2018

Termen de valabilitate:
2 ani (de la data producției)

Greutate netă **Capacitate**

11,1kg / 10L

www.rofert.ro