ROfert® Ca

Producțiile confirmă calitatea!

PFC 1(B)(II)
Îngrășământ lichid organo-mineral cu azot sub formă de soluție, îngrășământ cu micronutrienți 2,5/2,5

Conținutul de nutrienți declarat

Macronutrienți	**% m/v**	**% m/m**
Azot total (N)	3,38	2,50
Azot organic (N org.)	3,38	2,50
Oxid de Calciu (CaO)*	20,25	15 (=10,73% Ca)
Carbon organic (C org.)	25,3	18,73
Micronutrienți	**% m/v**	**% m/m**
Mangan (Mn)* sub formă de clorură	0,34	0,25
Zinc (Zn)* sub formă de clorură	0,27	0,20
*Complet solubil în apă		
Materie uscată	93,40	69,20
*Complet solubile în apă		
Îngrășământul conține suplimentar materie organică – 48,5% din substanța uscată		
A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza de aplicare.		

COMPONENTE
Componente: clorură de calciu[2] (nr. CAS 10043-52-4), hidrolizat de proteine vegetale[1].
[1] produse secundare ale industriei alimentare
[2] materii prime și amestecuri virgine.

ROfert Ca este un îngrășământ foliar profesional pe bază de calciu, îmbogățit cu aminoacizi de origine vegetală. Produsul a fost formulat special pentru culturile cu cerințe ridicate de calciu, asigurând corectarea eficientă a deficiențelor și maximizarea calității recoltei. Formula sa unică îmbină o concentrație ridicată de calciu cu aminoacizi care facilitează transportul și absorbția acestuia, făcând din acest produs o soluție recomandată pentru aplicările tardive din timpul sezonului de vegetație, în special în fazele critice de dezvoltare, în timpul formarii și coacerii fructelor.

CONDIȚII DE DEPOZITARE
Îngrășământul se păstrează și se transportă în ambalajele originale, bine închise, la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C, evitând variațiile bruște de temperatură. A nu se depozita îngrășămintele în straturi.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

FRAZE DE PERICOL
Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

FRAZE DE PRECAUȚIE
Spălați-vă bine mâinile și fața după utilizare. Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. În caz de iritare a pielii: Consultați medicul. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul. Aruncați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru eliminarea deșeurilor periculoase.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Doza (l/ha)	Numărul de tratamente și perioada
Cereale	3-5	De 1–3 ori, începând cu Faza de Burduf si pana la formarea completa a boabelor. De la 12 frunze ale culturii de porumb pana la formarea completa a boabelor.
Livezi, plantații de fructe de pădure	3-5	De 3–6 ori, de la aparitia primilor mugurilor florali si inclusiv in timpul coacerii fructelor
Legume	3-5	De 2–3 ori, începând din faza de creștere intensivă, inclusiv in timpul formarii fructelor sau a tuberculilor
Fertirigare	0,2-0,3%	De 3-5 ori, începând din faza de creștere intensivă, in timpul formarii fructelor, semintelor sau tuberculilor

PREPARAREA SOLUȚIEI DE LUCRU
1) Umpleți rezervorul pulverizatorului până la jumătate cu apă.
2) Porniți sistemul de agitare.
3) Adăugați cantitatea recomandată de îngrășământ, după omogenizarea prealabilă a produsului.
4) Adăugați produsul de protecție a plantelor, dacă este cazul.*
5) Completați rezervorul cu apă până la volumul final, menținând sistemul de agitare în funcțiune.
6) După efectuarea tratamentului, spălați pulverizatorul cu apă.
Soluția de lucru trebuie utilizată imediat după preparare.
A se omogeniza bine înainte de utilizare.
* Înainte de utilizarea în amestec cu produse de protecție a plantelor sau cu alte îngrășăminte, se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate (test în borcan).

TEHNICA DE APLICARE
Aplicare foliară – cu toate tipurile de pulverizatoare. Volumul de apă recomandat: culturi de câmp 200–400 L/ha; livezi și arbuști fructiferi 500–700 L/ha; culturi legumicole 400–600 L/ha.
Fertirigare – produsul poate fi utilizat în sistemele de irigare. A nu se depăși concentrația de 0,3%.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Nerespectarea recomandărilor privind depozitarea, amestecarea, diluarea și utilizarea produsului conform instrucțiunilor de pe etichetă poate afecta eficacitatea acestuia. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru consecințele, pierderile sau prejudiciile rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
Exclusiv pentru utilizatori profesionali.
Data fabricației și termenul de valabilitate / Nr. lotului: pe ambalaj.



PERICOL
RNMR-P6K3-M99T-AUX1

Produs pentru:
ROFERT ROMANIA S.R.L.
Str. Calea București, Nr.40,
Sat Pălținișu, Jud. Ialomița
Tel: 0729.036.395
E-mail: contact@rofert.ro
Producător VitaFer Sp. z o.o. sp.k.
ROfert este Marcă înregistrată
OSIM din 06/2018

Greutate netă **Capacitate**

13,5 Kg / 10L

www.rofert.ro