EPIN®

ROfert® Mn+

Producțiile confirmă calitatea!

CFP 1(C)(I)(b)(i)
Îngrășământ anorganic lichid simplu cu macroelemente N (Mg, S), în suspensie, care conține microelemente, 5(+1,6,+9) / 5(+0,96,+3,6)

Compoziție chimică (m/v | m/m):

Macronutrienți	**% m/v**	**% m/m**
Azot total (N)	8,25	5,00
Azot sub formă nitrică (NO_3)	8,25	5,00
Oxid de magneziu (MgO)*	2,64	1,60 (=0,96 % Mg)
Trioxid de sulf (SO_3)*	14,85	9,00 (=3,6 % S)
Microelemente	**% m/v**	**% m/m**
Cupru (Cu)* sub formă de sulfat	7,10	4,30
Mangan (Mn)*, 4% sub formă de sulfat, 7% sub formă de nitrat	18,15	11,00
Molibden (Mo)* sub formă de sare de sodiu	0,01	0,006
Zinc (Zn)* sub formă de clorură	6,11	3,70
* Complet solubile în apă		

ROfert® Mn+ este un fertilizant foliar special, ce îmbină acțiunea benefică a macro și microelementelor asupra tuturor plantelor de cultură.

BENEFICIILE PRODUSULUI ROFERT® MN+:

Sistemul imunitar al plantelor se îmbunătățește considerabil în urma aplicării, iar rezistența plantelor la instalarea bolilor crește datorită efectului antifungic al elementelor prezente în formula **ROfert® Mn+**, precum Sulf, Cupru, Mangan și Zinc. Datorită acțiunii elementelor nutritive precum Mangan și Zinc, **ROfert® Mn+** stimulează înfrățitul plantelor de Grâu, Orz, și lăstăritul plantelor de rapiță, crescând astfel, din punct de vedere cantitativ, recolta.

PREPARAREA SOLUȚIEI DE LUCRU

1) Umpleți rezervorul pulverizatorului până la jumătate cu apă,
2) porniți sistemul de agitare,
3) adăugați cantitatea recomandată de îngrășământ, după omogenizarea prealabilă a produsului,
4) adăugați produsul de protecție a plantelor, dacă este cazul,*
5) completați rezervorul cu apă până la volumul final, menținând sistemul de agitare în funcțiune,
6) după efectuarea tratamentului, spălați pulverizatorul cu apă.

Soluția de lucru trebuie utilizată imediat după preparare.
A se omogeniza bine înainte de utilizare.
* Înainte de utilizarea în amestec cu produse de protecție a plantelor sau cu alte îngrășăminte, se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate (test în borcan).

Cultură	**Doză produsului l/ha**	**Numărul tratamentelor și perioadele de aplicare**
Culturi de câmp	1-3	1–3 tratamente, de la faza de 4–6 frunze până la închiderea rândurilor / începutul alungirii paiului / dezvoltarea lăstarului principal
Livezi	1-3	2–3 tratamente, începând cu faza de buton verde și după recoltare / după apariția simptomelor de carență
Arbuști fructiferi	1-3	1–2 tratamente, în perioada de creștere intensivă
Culturi legumicole	0,2-0,3%	2 tratamente: în faza de 3–5 frunze (BBCH 15–18); al doilea la 2 săptămâni după primul tratament
A se utiliza numai în caz de necesitate justificată. A nu se depăși doza recomandată.		

TEHNICA DE APLICARE

Aplicare foliară – cu toate tipurile de pulverizatoare. Volumul de apă recomandat: culturi de câmp 200–400 L/ha; livezi și arbuști fructiferi 500–700 L/ha; culturi legumicole 400–600 L/ha.
Fertirigare – produsul poate fi utilizat în sistemele de irigare. A nu se depăși concentrația de 0,3%.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Îngrășământul se păstrează și se transportă în ambalajele originale, bine închise, la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C, evitând variațiile bruște de temperatură. În cazul depozitării în condiții necorespunzătoare (de exemplu, la temperaturi sub +5°C), poate apărea cristalizarea parțială sau modificarea culorii îngrășământului. Cristalele formate se vor redizolva după diluarea cu apă. Aceste fenomene nu afectează calitatea produsului. A nu se depozita îngrășămintele în straturi.

FRAZE DE PERICOL

Poate provoca leziuni ale organelor (creier) în caz de expunere prelungită sau repetată, în caz de inhalare. Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

FRAZE DE PRECAUȚIE

Nu inspirați ceața/vaporii/spray-ul. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a feței. Evitați dispersarea în mediu. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. În caz de iritare a pielii: Consultați medicul. Aruncați conținutul/recipientul la punctele de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările naționale.
Conține: sulfat de mangan monohidrat, nitrat de mangan.

COMPONENTE

Nitrat de magneziu[1] (nr. CAS 13446-18-9), nitrat de mangan[1] (nr. CAS 10377-66-9), sulfat de mangan[1] (nr. CAS 10034-96-5).
[1] Materii prime și amestecuri virgine.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Nerespectarea recomandărilor privind depozitarea, amestecarea, diluarea și utilizarea produsului conform instrucțiunilor de pe etichetă poate afecta eficacitatea acestuia. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru consecințele, pierderile sau prejudiciile rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
Exclusiv pentru utilizatori profesionali.
Data fabricației și termenul de valabilitate / Nr. lotului: a se vedea pe ambalaj.



PERICOL
UFI: RG4H-5EEG-RKKR-RP6T

Termen de valabilitate:
2 ani (de la data producției)

Produs pentru:
ROFERT ROMANIA S.R.L.
Str. Calea București, Nr.40,
Sat Pălținișu, Jud. Ialomița
Tel: 0729.036.395
E-mail: contact@rofert.ro
Producător VitaFer Sp. z o.o. sp.k.
ROfert este Marcă înregistrată
OSIM din 06/2018

www.rofert.ro

Greutate netă **16,5kg**
Capacitate **/10L**