EPIN®

ROfert® Zn+

Producțiile confirmă calitatea!

CFP 1(C)(I)(b)(ii)
Îngrășământ anorganic lichid compus cu macroelemente NK(S), în suspensie, cu microelemente, 5-2(+5,5) / 5-1,66(+2,2)

Compoziție chimică (m/v | m/m):

Macronutrienți	**% m/v**	**% m/m**
Azot total (N)	7,05	5,00
Azot sub formă ureică (NH_2)	7,05	5,00
Oxid de potasiu (K_2O)*	2,82	2,00 (=1,66 % K)
Trioxid de sulf (SO_3)*	7,76	5,50 (=2,2 % S)
Microelemente	**% m/v**	**% m/m**
Zinc (Zn)*: 10,5% sub formă de clorură, 4,5% sub formă de sulfat	21,15	15,00
*Complet solubile în apă		

ROfert® Zn+ este un îngrășământ lichid, destinat fertilizării foliare a culturilor, ce conține o concentrație mare de zinc, azot, sulf și potasiu, ce asigură o nutriție mai cuprinzătoare a plantelor. **ROfert® Zn+** este potrivit pentru utilizare preventivă împotriva instalării carenței de Zinc, pentru corectarea ei, dar și pentru completarea rapidă și sigură a necesarului nutrițional specific fiecărei culturi.

BENEFICIILE APLICĂRII:

Îmbogățirea **ROfert® Zn+** cu adjuvanți de înaltă calitate, îmbunătățește proprietățile soluției de stropit. Aplicat la culturile de toamnă, precum grâu, orz sau rapiță, **ROfert® Zn+** crește rezistența plantelor la condițiile de stres hidric și termic, stimulând totodată dezvoltarea sistemului radicular și formarea lăstarilor.

PREPARAREA SOLUȚIEI DE LUCRU

1) Umpleți rezervorul pulverizatorului până la jumătate cu apă.
2) Porniți sistemul de agitare.
3) Adăugați cantitatea recomandată de îngrășământ, după omogenizarea prealabilă a produsului.
4) Adăugați produsul de protecție a plantelor, dacă este cazul.*
5) Completați rezervorul cu apă până la volumul final, menținând sistemul de agitare în funcțiune.
6) După efectuarea tratamentului, spălați pulverizatorul cu apă.
Soluția de lucru trebuie utilizată imediat după preparare.
A se omogeniza bine înainte de utilizare.
* Înainte de utilizarea în amestec cu produse de protecție a plantelor sau cu alte îngrășăminte, se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate (test în borcan).

TEHNICA DE APLICARE

Aplicare foliară – cu toate tipurile de pulverizatoare. Volumul de apă recomandat: culturi de câmp 200–400 L/ha; livezi și arbuști fructiferi 500–700 L/ha; culturi legumicole 400–600 L/ha.

Cultură	**Doză produsului kg/ha**	**Numărul tratamentelor și perioadele de aplicare**
Culturi de câmp	0,7–2	1–2 tratamente, de la faza de 4–6 frunze / înfrățire / începutul perioadei de creștere intensivă
Livezi și arbuști fructiferi	0,7–2	1–2 tratamente, de la faza de buton verde până la înflorire
Culturi legumicole	0,7–2	1 tratament, la începutul perioadei de creștere intensivă
Fertirigare	0,05–0,1%	În funcție de necesarul culturii
A se utiliza numai în caz de necesitate justificată. A nu se depăși doza recomandată.		

Fertirigare – produsul poate fi utilizat în sistemele de irigare. A nu se depăși concentrația de 0,1%.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Îngrășământul se păstrează și se transportă în ambalajele originale, bine închise, la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C, evitând variațiile bruște de temperatură. În cazul depozitării în condiții necorespunzătoare, de exemplu la temperaturi sub +5°C, poate apărea o cristalizare parțială sau o modificare a culorii produsului. Cristalele formate se vor redizolva după diluarea cu apă. Aceste fenomene nu afectează calitatea produsului. A nu se depozita îngrășămintele în straturi.
În funcție de condițiile locale, trebuie luate măsuri de remediere adecvate.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

FRAZE DE PERICOL

Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

FRAZE DE PRECAUȚIE

Nociv în caz de înghițire. Provoacă leziuni oculare grave. Spălați-vă bine mâinile și fața după utilizare. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați la un CENTRU TOXICOLOGIC/medic, dacă nu vă simțiți bine. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU TOXICOLOGIC/medic. Clătiți gura.

COMPONENTE

Componente: uree[1] (nr. CAS 57-13-6), concentrat FZ20[1] (nr. CAS 999999-99-4), sulfat de zinc[1] (nr. CAS 7446-19-7), clorură de zinc[1] (nr. CAS 7646-85-7)
[1] Materii prime și amestecuri virgine.
Acest îngrășământ conține uree, care poate elibera amoniac și poate afecta calitatea aerului.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Nerespectarea recomandărilor privind depozitarea, amestecarea, diluarea și utilizarea produsului conform instrucțiunilor de pe etichetă poate afecta eficacitatea acestuia. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru consecințele, pierderile sau prejudiciile rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
Exclusiv pentru utilizatori profesionali.
Data fabricației și termenul de valabilitate / Nr. lotului: a se vedea pe ambalaj.



ATENȚIE
UFI: 94MR-N6EQ-S99U-CTEN

Termen de valabilitate:
2 ani (de la data producției)

Produs pentru:
ROFERT ROMANIA S.R.L.
Str. Calea București, Nr.40,
Sat Pălținișu, Jud. Ialomița
Tel: 0729.036.395
E-mail: contact@rofert.ro
Producător VitaFer Sp. z o.o. sp.k.
ROfert este Marcă înregistrată
OSIM din 06/2018

www.rofert.ro

Greutate netă **14kg** / **Capacitate** **9,9L**